



COLOPROCTOLOGIA
Y CIRUGIA GENERAL

QUISTE PILONIDAL

Dr. Uriel Cruz Calderón

Coloproctología • Colonoscopia
Cirugía General • Hernias
Laparoscopia avanzada

- ¿Qué es un quiste pilonidal?
- ¿Qué síntomas ocasiona?
- ¿Cómo se diagnostica?
- ¿Cuál es su tratamiento?
- ¿Qué probabilidades tengo de curarme sin cirugía?
- ¿Qué tipo de cirugías existen?
- ¿Qué debo esperar después de la cirugía?

¿Qué es un quiste pilonidal?

Es un quiste que se forma porque un pelo se entierra muy profundo en la piel (muy cercano al hueso). Su localización más frecuente es en la parte más baja de la espalda o entre los glúteos.



¿Qué síntomas ocasiona?

Al inicio no se produce ningún síntoma, sólo se observa uno o varios orificios en la piel (que son los sitios por donde se enterraron los pelos). En algún momento el quiste se infecta, produciendo entonces dolor y un absceso.



Quiste pilonidal no infectado
Se observan varios orificios en la piel.



Quiste pilonidal infectado
Se observa un absceso y, alrededor, los orificios en la piel.

¿Cómo se diagnostica?

Un médico calificado sólo requiere de la observación de la lesión donde identificará los orificios en la piel, los pelos enterrados o el absceso. Un médico con poca experiencia lo pasará por alto o bien, pensará que sólo se trata de un “absceso común y corriente”.



**Se observan múltiples orificios;
en el interior del más grande hay varios pelos.**

¿Cuál es su tratamiento?

Si el quiste se encuentra infectado (absceso), se requiere de abrir el quiste para sacar el pus. Los antibióticos no sirven en los abscesos. Una vez que la infección ha pasado es necesario realizar una cirugía para retirar el quiste.



Cirugía de un quiste pilonidal.

¿Qué probabilidades tengo de curarme sin cirugía?

La cirugía es la única manera de curar la enfermedad; mientras no se haga se presentaran abscesos cada vez más frecuentemente, complicando más la enfermedad.

¿Qué tipo de cirugías existen?

Existen muchos tipos de cirugías que se realizan de acuerdo a lo complicado que sea el caso; sin embargo, en todos los casos se busca quitar el quiste por completo. Su médico le podrá indicar cuál es el tipo de cirugía que se requiere para su caso en particular.

¿Qué debo esperar después de la cirugía?

La cirugía ocasiona un dolor tolerable con analgésicos. En ocasiones es necesario dejar tubos de drenaje para evitar que se acumule líquido en la herida. Los puntos de la cirugía se retiran en 2 o 3 semanas ya que las heridas en este sitio tardan más tiempo en cicatrizar que en otras partes del cuerpo.



Herida inmediatamente después de la cirugía.



Herida de la cirugía ya cicatrizada.

Acuda a consulta con un médico especialista en Coloproctología y Cirugía General debidamente certificado para tener un diagnóstico de certeza y tratamiento apropiado.

